

Cultuurhistorische info over de planten geplant op de Schotborgschool

Soort	Lokale naam	Verhaal
<i>Acaciella glauca</i>	Mata Galina	Thee van de wortels tegen buikpijn. Lange recht duurzame stokken gebruikt voor kooitjes.
<i>Annona glabra</i>	Kayuda	Heerlijke vruchten: smaakt naar Leechy. Vooral bij bronnen te vinden. Voedselboom van de indianen
<i>Annona squamosa</i>	Skopapel	Heerlijke vrucht nog te kopen op de markt droogte resistent
<i>Ayenia magna</i>		
<i>Bontia daphnoides</i>	Olijfi	Vooral te vinden langs de kust
<i>Bourreria succulenta</i>	Watakeli	Snelgroeïende Kleine boom vol bloemen en vruchten trekt vogels en vlinders.
<i>Bromelia humilis</i>	Teku	Vangt water na Kleine buien. Belangrijk bron van water voor dieren ook in de droge tijd. Bedekt de bodem en produceert veel humus.voor vruchtbare bodem.
<i>Bursera tomentosa</i>	Takamahak	Voormalig als levende palen voor afrastering
<i>Caesalpinia coriaria</i>	Watapana	Voorheen economisch belangrijk plantageproduct voor looistoffen in de peulen. Ooit uitgeroepen tot beschermde boom. Veel vlinders.
<i>Casearia tremula</i>	Guayaba baster	De boom van keuze voor constructie van rancho: tijdelijke veldhutten van voorheen.
<i>Celosia virgata</i>		
<i>Coccoloba swartzii</i>	Kamalia	Lekkere Kleine besjes die naar appel smaken. Vroeger gepluk door de mensen
<i>Cocco/oba uvifera</i>	Dreifi di laman	Zeedruif. Vroeger geplukt en gegeten.
<i>Commelina erecta</i>	Maishi grandi shimaron Yerba di kamisa	Mooie blauwe bloempjes on in je kamisa te zetten.
<i>Conocarpus erectus</i>	Mangel blanku	Van de kust

<i>Cordia bullata</i>	San wan	
Soort	Lokale naam	Verhaal
<i>Cordia curassavica</i>	Basora pretu	Belangrijke besjes voor de vogels, bv alablanka
<i>Cordia dentata</i>	Karawara di mondi	Eetbare zoete slijmerige vruchten. Vroeger ook gebruikt voor lijm in de huiselijke setting. Bezocht door vogels en vleermuizen. Heel fijn bewerkbaar hout: pali chapi, en pali funchi.
<i>Crateva tapia</i>	Surun di mondi	Vruchten gebruikt in de cuisine. Smaken naar knoflook. Groene vruchten zeer bijtend. Rijpe vruchten te gebruiken. Belangrijke vlinderwaardboom. Voedsel boom van de indianen. Wordt in Venezuela nog gebruikt
<i>Crescentia cujete</i>	Kalbas	Heel licht taai duurzaam hout veel gebruikt. In botenbouw, vlechtwerken. Vruchten als gebruiksvoorwerpen komen bekere lepels. . De zaden vroeger geroosterd met suiker voor karabobo. Tegenwoordig alleen voor stropi di kalbas. Bloeit snachts voor de vleermuizen.
<i>Crossopetalum rhacoma</i>	Palu di pushi	Draagt heel het jaar vrucht. Belangrijk voor vrucht etende vogels.
<i>Croton ovalifo/ius</i>	Verba di seru	
<i>Cynophal/a linearis</i>	Kedebeshi	Belangrijk voedsel voor de blauwduif
<i>Erythroxylum havanense</i>		
<i>Eugenia procera</i>		
<i>Ficus brittonii</i>	Mahok di mondi	Zeer zeldzaam ook bekend als mata palu.
<i>Geoffroea spinoza</i>	Palu di taki	Vooral in rooien bv Christoffelpark. Lekkere gele eetbare vruchten. Vroeger geplukt. Voedselboom van de indianen.

Soort	Lokale naam	Verhaal
<i>Guaiacum officinale</i>	Wayaka	Kan 100den jaar oud worden. Zeer langzaam groeiend. Vroeger gekapt voor zelfsmerend hout vv de hars. Gebruikt in katrollen bv.. Internationaal beschermd. Waardboom voor de gele vlinder Kricogonia.
<i>Guaiacum sanctum</i>	Wayaka shimaron	Zelfde als wayaka. Internationaal beschermd
<i>Guapira fragrans</i> <i>Guapira pacurero</i>	Labra	
<i>Haematoxylum brasiletto</i>	Brasia	Vroeger economisch-belangrijke boom massaal gekapt door de WIC en Spanjaarden. Voor kleurstoffen (paars, roodgeel) in het hout. Eerst geraspt in het rasphuis (gevangenis) in Amsterdam. Daarna met oplosmiddelen geëxtraheerd.
<i>Handroanthus bil/bergii</i>	Kibrahacha	Zeer hard hout. Bloeit als eerst na regenbuien helemaal geel.
<i>Helicteres carthagenensis</i> <i>Hibiscus phoenicus</i> <i>Hippomane mancinella</i>	Rosita Manzalina	Bijtend zuur in sap en bladeren. Rijpe vruchten gegeten door leguanen en krabben. Lekkere noot vroeger geroosterd en gegeten
<i>Jacquinia arborea</i>	Mata di piska	Kustboom. Altijdgroen. Hout vroeger gekapt om met de sappen in de bast vissen te verdoven en makkelijk te vangen. Heerlijke parfum van de bloemen. .
<i>Jatropha gossypifolia</i>	Flaira	Medicinaal. De parkieten lusten de vruchtjes.
<i>Lantana camara</i>	Flor di sanger	Belangrijk nectarplant voor vlinders en kolibries
<i>Madura tinctoria</i>	Dushi di kabei	Vroeger gekapt en gele/bruine kleurstoffen gebruikt voor khaki kleur (fustic) in textiel. Vruchten groen harig zoet en eetbaar (als moerbeij).

Soort	Lokale naam	Verhaal
<i>Malpighia emarginata</i>	Shimaruku	Heerlijke vruchten. Vruchten alleen een korte tijd aan de boom enkele weken na de eerste zware regens.
<i>Mata/ea rubra</i>	Maripompun	Heerlijke groente van de groene vruchten.
<i>Maytenus tetragona</i>		
<i>Me/ocactus macrocanthus</i>	Milon di seru	Eetbare vruchten
<i>Myrcia curassavica</i>		Endeem
<i>Peltophorum acutifolium</i>	Kurahout	Endemisch zuidelijk Cariben
<i>Phyllanthus botryanthus</i>	Loki-loki	
<i>Prosopis juliflora</i>	Indju	Vroeger belangrijk in botenbouw en voor houtskool. Groeit terug na kap. Vruchten gemalen tot meel en gebruikt om guarapa te maken alcoholisch drank (indianen). Niet meer hier te krijgen maar wel in Guajira..
<i>Quadrel/a indica</i>	Palu pretu	Altijd groen vruchten belangrijk voedsel voor duiven.
<i>Quadrella odoratissima</i>	Oliba	Net als palu pretu
<i>Randia aculeata</i>	Palu di lele	Gebruikt in de keuken als mixer blender. En als inheemse kerstboom
<i>Rivina humilis</i>	Stakamahakchi	
<i>Ruellia tuberosa</i>	Skopet	Mooie paarse bloemen rijpe zaad dozen exploderen om de zaaidjes te verspreiden.net als hagel geweer. Vandaar de naam skopet.
<i>Ruprechtia curranii</i>	Mangel di sabana	Mannetjes en vrouwtjesbomen andere kleur van bloemen (wit/rood). Niet op Bandariba voorkomend/
<i>Sabal antillensis</i>	Kabana	Endeem. alleen Curacao. Vroeger belangrijk als dak bedekking en om duurzame manden mee te vlechten
<i>Senna atomaria</i>	Bonchi largu Strena di kantu di	
<i>Sophora tomentosa</i>	laman	Langs de kust



Soort	Lokale naam	Verhaal
<i>Stenocereus griseus</i>	Datu	Lekkere vruchten. Smaak tussen framboos en watermeloen. Gebruikt voor hagen. Belangrijk voor vogels en andere dieren in de droge tijd van het jaar.
<i>Tournefortia volubilis</i>	Klasmulato	
<i>Trichilia trifolia</i>	Shimaruku machu	
<i>Xylosma flexuosa</i>		
<i>Zanthoxylum monophyllum</i>	Basua	



Totaal 600
Aantal soorten 63

Aanvullende aantekeningen

1. **Struik:** 96 planten (16,0%)
2. **Boom:** 396 planten (66,0%)
3. **Grondbedekker:** 5 planten (0,83%)
4. **Kleine boom:** 41 planten (6,83%)
5. **Kruid:** 43 planten (7,17%)
6. **Klimplant:** 4 planten (0,67%)
7. **Bolcactus:** 5 planten (0,83%)
8. **Palm:** 5 planten (0,83%)
9. **Zuilcactus:** 5 planten (0,83%)

